

Erythrasma

Presentation

- Usually start as a pink patch that rapidly progress into brown scaly patch with well demarcated flat edges , usually without itching
بتبدأ غالباً ببقعة وردية بتقشر بسرعة و تعمل بقعة بني أطرافها محددة و سطحية.. غالباً مش معها هرش
- **Usually occur in intertriginous areas (skin folds)**
like candida & Tinea cruris as groin, armpit & under breast
بتحصل غالباً في تنيات الجسم زي التينيا و الكانديدا و بتبقى شبيههم جداً
- **Common in diabetic & obese patients esp. in hot weather**
بتيجي غالباً في مرضى السكر و اللي عندهم سمنة خصوصاً في الجو الحر

D.D

1. Tinea Cruris

Red patches with raised edges – usually with itching

2. Candidiasis (intertrigo)

Red patches with satellites lesions – usually with itching

Treatment

1. Instructions

١. الاستحمام باستمرار مع تنشيف المنطقة المصابة جيداً لبس ملابس قطنية وواسعة
٢. ما يستخدم مش فوط شخص آخر
٣. الهدوم تتغسل و تتغلي كويس
٤. لو عنده سكر يظبطه و لو تخين يحاول ينزل وزنه

2. Topical antibiotic

Fucidin cream

10 LE

دهان صباحاً و مساءً

3. Systemic antibiotic

Erythrocin 500 tab

12 tab .. 12 LE

قرص كل ١٢ ساعة لمدة ٥ أيام

4. Topical anti-fungal

Dermatin, Batrafen or Miconaz creams

يفضل انك تزود الكريمات دي عشان تغطي التينيا و الكانديدا لو هما السبب

Candidiasis (Intertrigo)Presentation

- Red patch with satellite lesions at edges, usually with itching
غالباً البقع بتبقى حمرا و أطرافها منقطة ومعها ههرش
- Usually occur in intertriginous areas (skin folds)
like tinea cruris & erythrasma as groin, armpit & under breast
- Common in diabetic & obese patients esp. in hot weather
- Candidiasis is rarely contagious نادراً ما تكون معدية

Treatment

1. Instructions

١. الاستحمام باستمرار مع تنشيف المنطقة المصابة جيداً لبس ملابس قطنية وواسعة
٢. ما يستخدمش فوط شخص آخر
٣. الهدوم تتغسل و تتغلي كويس
٤. لو عنده سكر يضبطه و لو تخين يحاول ينزل وزنه

2. Combined topical anti-fungal & weak steroid

مضاد فطريات + كورتيزون ضعيف عشان الهرش

Dermatin-cort cream	3.5 LE
Miconaz-H cream	5.5 LE
Daktacort cream	8 LE

دهان صباحاً و مساءً لمدة أسبوع بعد اختفاء البقع

(عند وضع الكريم زود ٥ سم حول البقع)

يفضل استخدام الكريمات دي حتى اختفاء الهرش فقط ثم تستبدل بكريم يحتوي على مضاد فطريات فقط حتى لا يقلل الستيرويد من تأثير مضاد الفطريات

3. Systemic Anti-fungals (Fluconazole is the best)

غالباً مش بلجالها الا في حالة

(تكرار المشكلة - لو ماخفش مع الكريم - لو البقع كتيرة)

Flucoral caps	2 capsules ..14.5 LE
Fungican caps	1 capsule .. 10 LE

كبسولة واحدة في الاسبوع لمدة ٤ أسابيع

Tinea Cruris

Presentation

- **Red patch with elevated edges, usually with itching**
غالباً البقع بتبقى حمرا و أطرافها مرتفعة عن الجلد ومعها هرش
- **Usually occur in intertriginous areas (skin folds)**
Like candidiasis & erythrasma as groin, armpit & under breast
- **Common in diabetic & obese patients esp. in hot weather**
- **T.Cruris is contagious**
معدية و تنتقل من شخص لآخر

Treatment

1. Instruction نفس التعليمات
2. Combined topical anti-fungal & weak steroid نفس التعليمات
3. Systemic Anti-fungals
 - Terbinafine
Lamisil 250 7 tab .. 47 LE
Terbin 250 7 tab .. 26 LE
مرة واحدة يومياً لمدة ١ - ٤ أسابيع
 - Itraconazole
Itrapex 100 15 capsules .. 60 LE
كبسولتين في اليوم لمدة أسبوع

Tinea Circinata (T.Corporis) التينيا الحلقية

Presentation

- Red rings with elevated edges showing vesicles and central healing
حلقات حمراء أطرافها مرتفعة عن الجلد و مركزها شكله طبيعي
- Usually NOT itchy غالباً مش بتهرش
- T. Circinata is Contagious معدية و تنتقل من شخص لآخر

Treatment

1. Instructions نفس التعليمات
2. Topical anti-fungal
نفس الكريم أو الشامبو المستخدم في Tinea Versicolor لكن الجرعة دهان صباحاً و مساءً لمدة أسبوع بعد اختفاء الحلقات
3. Systemic Anti-fungals

Tinea Cruris ني